

## Produits pour les soins de bouche des personnes en situation de dépendance

### Dentifrice Duraphat



#### Mode d'emploi :

- Une fois par semaine, à la place du dentifrice habituel
- Recracher après le brossage des dents et ne pas rincer à l'eau

### Plak-out Gel



#### Mode d'emploi :

- En cas de forte **inflammation** des gencives (saignements)
- Pour des personnes qui ne sont pas capable de rincer la bouche
- Appliquer avec le doigt deux fois par jour sur les endroits concernés
- Ne pas boire immédiatement après l'application
- A utiliser jusqu'à ce que le petit tube (5 g) soit terminé

### Solution pour bain de bouche Chlorhexamed



#### Mode d'emploi :

- En cas de forte **inflammation** des gencives (saignements)
- Pour des personnes qui sont capables de rincer la bouche
- Rincer la bouche pendant 30 secondes deux fois par jour avec 10 ml de solution non diluée (voir le bouchon-doseur)
- Recracher et ne pas rincer à l'eau
- A utiliser pendant deux semaines

## Produits pour les cas spéciaux


### Emofresh et gel Aldiamed



#### Mode d'emploi :

- En cas de **sécheresse buccale**
- Appliquer plusieurs fois par jour 1 cm de gel avec le doigt sur les muqueuses et sur la langue


### Pâte Solcoseryl



#### Mode d'emploi :

- En cas de légères **lésions** de la muqueuse buccale (aphtes, points de pression des prothèses)
- Appliquer 1 à 2 fois par jour une fine couche sur la lésion préalablement tamponnée avec une gaze

### Grands bâtons d'ouate



#### Mode d'emploi :

- Lorsque le brossage des dents et le rinçage ne sont plus possibles
- Pour éliminer les restes alimentaires et humidifier la bouche (p. ex. avec Aldiamed, Kamillosan, ou de l'extrait de mauve)